

Planification familiale




Évaluation des Prestations
des Services de soins de Santé (EPSS)
2017-2018
République Démocratique du Congo

Disponibilité des services de planification familiale (PF)

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant :



Méthode réversible moderne




Méthode permanente
(stérilisation masculine ou
féminine)



Méthode moderne réversible
ou permanente


Disponibilité des services de PF selon le type de FOSA

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant une méthode moderne réversible ou permanente



Disponibilité des services de PF selon le secteur d'appartenance


Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant une méthode moderne réversible ou permanente



Disponibilité des services de PF selon la province


Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant une quelconque méthode de PF

**RDC
69 %**




Méthodes de PF offertes

Parmi les FOSA offrant des services de planification familiale (N=954), pourcentages qui fournissaient des méthodes spécifiques de planification familiale aux clients




Disponibilité des produits de PF

Parmi les FOSA qui fournissaient des méthodes modernes de PF, pourcentages de celles où les produits étaient observés comme étant disponible le jour de l'enquête




Disponibilité des produits de PF selon le type de FOSA

Parmi les FOSA qui fournissaient les méthodes modernes de PF, pourcentages de celles où toutes les méthodes fournies étaient observées disponibles le jour de l'enquête



Disponibilité des produits de PF selon le secteur d'appartenance

Parmi les FOSA qui fournissaient les méthodes modernes de PF, pourcentage de celles où toutes les méthodes fournies étaient observées disponibles le jour de l'enquête




- Disponibilité des services et des méthodes de PF
- **Éléments pour les services de PF**
- Consultations de PF
- Connaissances de la cliente sur la méthode contraceptive
- Formation des prestataires




Équipements et matériels pour les services de PF

Parmi les FOSA offrant des méthodes modernes de PF (N=935), pourcentage qui disposaient de :




Éléments de prévention des infections pour les services de PF

Parmi les FOSA offrant des méthodes modernes de PF (N=935), pourcentage qui disposaient de :




Antécédents médicaux et examen physique des clientes en PF effectuant leur première visite

Parmi les clientes effectuant leur première visite en planification familiale et qui ont été observées (N=183), pourcentages de celles dont les consultations comprenaient



Composantes des conseils et des discussions avec toutes les clientes lors des consultations en PF

Parmi toutes les clientes en PF dont la consultation a été observée (N=287), pourcentages de celles pour lesquelles la consultation comportait



Connaissances de la cliente sur la méthode contraceptive

Parmi les clientes en planification familiale interviewées qui avaient reçu, ou à qui on avait prescrit ou recommandé une méthode:


- **100 %** de clientes ayant adopté **la pilule** connaissaient à quelle fréquence la prendre (chaque jour)
- **94 %** de clientes ayant adopté **le préservatif masculin** connaissaient qu'il ne fallait l'utiliser qu'une seule fois
- **85 %** de clientes ayant adopté **le préservatif féminin** connaissaient qu'il fallait l'utiliser seulement une seule fois

Connaissances de la cliente sur la méthode contraceptive (2)

- **71 %** de clientes ayant adopté **les progestatifs injectables** connaissaient la durée de protection contre la grossesse que fournissait l'injection reçue
- **97 %** de clientes ayant adopté **l'implant** connaissaient la durée de protection contre la grossesse que fournissait cette méthode
- **91 %** de clientes ayant adopté **le DIU** connaissaient ce qu'il faut faire pour s'assurer que le DIU est en place

Formation des prestataires des services de PF

Pourcentage de prestataires des services de planification familiale interviewés (N=4 459) ayant reçu une formation sur:



Résultats clés

- **68 %** des FOSA offraient **une méthode moderne réversible ou permanente** de PF
- Dans **50 %** des FOSA qui fournissaient les méthodes modernes de PF, **toutes les méthodes fournies étaient observées disponibles** le jour de l'enquête
- Dans **17 %** des consultations PF qui étaient la première visite **tous les éléments des antécédents reproductifs** ont été recherchés et dans **23 %** des cas **tous les antécédents médicaux à risque**

Soins prénatals



Évaluation des Prestations
des Services de soins de Santé (EPSS)
2017-2018
République Démocratique du Congo

- Disponibilité des services de consultation prénatale (CPN)
- Éléments pour la prestation des services de CPN
- Évaluation des CPN
- Formation des prestataires
- Services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME)
- Services de paludisme pendant la grossesse



© 2013 Annemarie Boks/AIMNL, avec la permission de Photoshare

- **Disponibilité des services de consultation prénatale (CPN)**
- Éléments pour la prestation des services de CPN
- Évaluation des CPN
- Formation des prestataires
- Services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME)
- Services de paludisme pendant la grossesse



© 2013 Annemarie Boks/AIMNL, avec la permission de Photoshare

Disponibilité des services de CPN


96 % des FOSA offraient des **services de CPN**.

Fréquence de la disponibilité des services de CPN

Parmi les FOSA offrant les services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui offraient ces services le nombre des jours indiqués par semaine

Fréquence par semaine

■ 1-2 Jours ■ Au moins 3 jours



Note : Certaines FOSA offraient le service que moins de quatre jours par mois


- Disponibilité des services de consultation prénatale (CPN)
- **Éléments pour la prestation des services de CPN**
- Évaluation des CPN
- Formation des prestataires
- Services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME)
- Services de paludisme pendant la grossesse



© 2013 Annemarie Boks/AIMNL, avec la permission de Photoshare


Équipements pour les services de CPN

Parmi toutes les FOSA offrant des services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui disposaient de :




Éléments de prévention des infections dans les services de CPN

Parmi toutes les FOSA offrant des services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui disposaient de :




Capacité de diagnostic

Parmi toutes les FOSA offrant des services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles ayant la capacité d'effectuer des tests de :



Disponibilité des médicaments pour la CPN de routine

Parmi toutes les FOSA offrant les services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui disposaient de :




- Disponibilité des services de consultation prénatale (CPN)
- Éléments pour la prestation des services de CPN
- **Évaluation des CPN**
- Formation des prestataires
- Services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME)
- Services de paludisme pendant la grossesse



© 2013 Annemarie Boks/AIMNL, avec la permission de Photoshare


Examen physique de base

Parmi les femmes enceintes venues en CPN et dont les consultations ont été observées (N=4 512), pourcentages pour lesquelles la consultation intégrait :




Interventions préventives

Parmi les femmes enceintes venues en CPN et dont les consultations ont été observées (N=4 512), pourcentages pour lesquelles le prestataire avait :



Signes de danger inhérents à la grossesse

Parmi les femmes enceintes venues en CPN et dont les consultations ont été observées (N=4 512), pourcentages de celles pour lesquelles la consultation incluait des conseils sur :




- Disponibilité des services de consultation prénatale (CPN)
- Éléments pour la prestation des services de CPN
- Évaluation des CPN
- **Formation des prestataires**
- Services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME)
- Services de paludisme pendant la grossesse



© 2013 Annemarie Boks/AIMNL, avec la permission de Photoshare

Formation des prestataires des services de CPN

Pourcentage de prestataires des services de CPN interviewés (N=6 650) qui avaient reçu une formation sur :




- Disponibilité des services de consultation prénatale (CPN)
- Éléments pour la prestation des services de CPN
- Évaluation des CPN
- Formation des prestataires
- **Services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME)**
- Services de paludisme pendant la grossesse



© 2013 Annemarie Boks/AIMNL, avec la permission de Photoshare

Disponibilité des services de PTME selon le type de FOSA


Parmi toutes les FOSA offrant les services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui fournissaient au moins un service de PTME :



Disponibilité des services de PTME selon la province


Parmi toutes les FOSA offrant les services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui fournissaient au moins un service de PTME :

RDC
58 %



Disponibilité des composantes de la PTME

Parmi toutes les FOSA offrant les services de CPN et au moins un service de PTME (N=773), pourcentage qui fournissaient :




- Disponibilité des services de consultation prénatale (CPN)
- Éléments pour la prestation des services de CPN
- Évaluation des CPN
- Formation des prestataires
- Services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME)
- **Services de paludisme pendant la grossesse**



© 2013 Annemarie Boks/AIMNL, avec la permission de Photoshare


Disponibilité des médicaments contre le paludisme

Parmi toutes les FOSA offrant les services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui disposaient de :



Capacité diagnostic du paludisme

Parmi toutes les FOSA offrant les services de CPN (N=1 330), pourcentage de celles qui avaient la capacité de faire :



Résultats clés

- **96 %** des FOSA offraient des **services de CPN**.
- **60 %** des FOSA offrant des services de CPN disposaient de **vaccin antitétanique**.
- Dans moins de la moitié des consultations observées (**35 %**) au moins **un des signes de danger** a été discuté.
- **58 %** des FOSA offrant des services de CPN fournissaient un **service quelconque de PTME**