




Dans toutes les provinces, parmi les PS qui ont eu des symptômes d'IST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, plus de trois sur cinq ont recherché conseils au cours du dernier épisode d'IST. Cependant, au cours de cet épisode, moins de la moitié de PS ont pris des médicaments, sauf au Maniema (65,6%) et au Nord-Kivu (75,6%).



% des PS qui n'ont jamais été testé pour le VIH




La proportion de PS qui n'ont jamais été testé pour le VIH reste élevée. En dehors des provinces de Kinshasa, du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, environ quatre PS ou plus sur dix ne sont jamais testé précédemment pour le VIH..




Prévalence de VIH chez les PS

Moins d'une PS sur dix était positive au VIH dans les provinces du Bas-Uélé, du Haut-Katanga, du Kwilu et du Kongo-central, alors qu'environ une PS sur dix étaient positive au VIH dans les provinces du Kasai-Oriental, du Nord-Kivu et de la Tshopo.



Moins de quatre PS sur dix, ont rapporté avoir entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours de six derniers mois précédant l'enquête, excepté dans les provinces du Maniema (50,4%), de la Tshopo (52,6%), de l'Ituri (54,1%) et du Bas-Uélé (74,3%).

% des PS qui ont entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours de 6 derniers mois précédant l'enquête




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Enquête de surveillance bio-comportementale auprès des populations clés à risque de l'infection par VIH dans 14 provinces, 2018-2019


Principaux résultats chez les professionnelles de sexe




Age médian (ans) des PS



% des PS qui ont utilisé un condom lors du rapport sexuel avec le dernier client




% des PS qui ont une connaissance approfondie sur le Sida



*Savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le virus du Sida, savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du Sida et rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission du virus du Sida par la piqûre de moustique et par la sorcellerie.

% des PS qui ont recherché un conseil ou pris des médicaments lors du dernier épisode d'IST au cours des 12 mois précédant l'enquête



50%

La moitié de PS avait eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 14 ans. Deux années après le premier rapport sexuel, la moitié de PS commençait à avoir des rapports sexuels payant.



Plus de trois sur quatre PS ont utilisé le préservatif lors du dernier rapport sexuel payant dans les provinces de Kinshasa (95,8%), Kongo-Central (91,3%), Tshopo (88,9%), Kasai-Oriental (81,1%), Haut-Katanga (80,4%) et Kwilu (79,1%). Les proportions les plus faibles ont été notées dans le Haut-Uélé (25,7%) et le Bas-Uélé (28,6%).

Globalement, moins d'une PS sur quatre possédait 'une connaissance approfondie sur le VIH; excepté au Maniema où un peu plus de la moitié la possédait.