





Pour toutes les cibles (PS, HSH et UDI), plus de 90 pourcents de ceux qui avaient une connaissance antérieure de leur statut sérologique VIH positif et qui étaient sous traitement antirétroviral, avaient une charge virale supprimée.

Pourcentage de personnes sous traitement ARV avec une charge virale supprimée




Pourcentage de personnes ayant déjà été testées pour le VIH et ayant retiré le résultat

Pour toutes les cibles (PS, HSH et UDI), plus de neuf sur dix ont rapporté avoir déjà été testés pour le VIH et avoir retiré le résultat du test.




Séroprévalence (%) du VIH et de la Syphilis

Huit pourcents des PS et sept pourcents des HSH étaient positives au VIH, cette proportion était de quatre pourcents chez les UDI. Deux pourcents des PS étaient positives à la syphilis, alors que seul moins d'un pourcent des HSH et des UDI l'ont été.



La près de la moitié des UDI ont déclaré n'avoir pas utilisé une seringue neuve lors de la dernière injection de drogue au cours des six derniers mois ayant précédé l'enquête.

Pourcentage de UDI (n=1701) ayant utilisé une seringue neuve lors de la dernière injection de la drogue au cours des six derniers mois ayant précédé l'enquête




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Enquête de surveillance bio-comportementale auprès des populations clés à risque de l'infection par VIH dans 14 provinces, 2018-2019

INDICATEURS CLES AGREGES AU NIVEAU NATIONAL POUR LES CIBLES RDS




Pourcentage de personnes ayant déclaré avoir été exposé à un message sur la prévention du VIH au cours des 6 derniers mois ayant précédé l'enquête




Dans l'ensemble du pays, moins de quatre PS sur dix ont rapporté avoir entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours de six derniers mois précédant l'enquête. Cette proportion est d'environ la moitié pour les UDI et les HSH.

% de personnes ayant déclaré avoir eu un rapport sexuel avec un partenaire non régulier au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'enquête




Plus de neuf sur dix PS ont déclaré avoir eu un rapport sexuel avec un partenaire non régulier au cours de 12 derniers mois précédant l'enquête. Cette proportion était d'environ huit sur dix et sept sur dix respectivement chez les HSH et les UDI.

Pourcentage de personnes ayant déclaré avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'enquête




Environ trois PS sur quatre ont utilisé le préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'enquête. Cependant, seule un peu plus de la moitié des HSH et moins de la moitié des UDI l'ont utilisé lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier.

Pourcentage de personnes VIH testées VIH+ lors de l'enquête



Moins de la moitié de PS testé positives au VIH au cours de l'enquête avaient une connaissance antérieure de leur statut sérologique VIH positif. Ce pourcentage était de près de sept sur dix et de près de six sur dix respectivement chez les HSH et les UDI.

Pourcentage de personnes VIH testées VIH+ lors de l'enquête et qui sont sous traitement ARV



Plus de 90 pourcents des PS et des HSH séropositifs qui avaient une connaissance antérieure de leur statut sérologique VIH positif étaient sous traitement. Ce pourcentage était de moins de 90 pourcents chez les UDI.