





Dans toutes les provinces, parmi les HSH qui ont eu des symptômes d'IST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, plus de trois sur cinq ont recherché conseils au cours du dernier épisode d'IST. Cependant, au cours de cet épisode, moins de trois sur dix ont bénéficié d'un traitement, excepté à Kinshasa (61%).

### % d'HSH qui ont recherché un conseil ou pris des médicaments lors du dernier épisode d'IST au cours des 12 mois précédant l'enquête




### % des PS qui n'ont jamais été testé pour le VIH

Dans le Haut-Katanga et en Ituri, plus de six HSH sur dix ont déclaré n'avoir jamais été précédemment testé pour le VIH. Cette proportion était la plus faible à Kinshasa, soit près du quart.




Dans toutes les provinces, environ la moitié de HSH ont rapporté avoir entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours de six derniers mois précédant l'enquête, excepté dans le Kongo-Central (38,4%).

### % d'HSH qui ont entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête



### Prévalence (%) du VIH et de la Syphilis chez les HSH

La prévalence du VIH parmi les HSH était la plus élevée à Kinshasa (8,9%) et la plus basse en Ituri (0,8%). Dans toutes les provinces, la prévalence de la syphilis était de moins d'un pourcent.



## REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Enquête de surveillance bio-comportementale auprès des populations clés à risque de l'infection par VIH dans 14 provinces, 2018-2019

Principaux résultats chez les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes (HSH)




## Age médian (ans) des HSH




## Sexe du partenaire (%) au dernier rapport sexuel au cours des 6 mois précédant l'enquête



## % d'HSH qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire masculin/féminin au cours des 6 mois précédant l'enquête



## % d'HSH qui utilisent généralement un lubrifiant avec le condom.



A Kinshasa, trois HSH sur quatre utilisent généralement le lubrifiant avec le préservatif. Cette proportion est très faible dans les trois autres provinces, notamment dans le Haut-Katanga où moins d'un HSH sur cinq utilise généralement le lubrifiant avec le préservatif

50%


La moitié de HSH avait eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Une année après le premier rapport sexuel, la moitié de HSH de Kinshasa ont eu leur premier rapport sexuel avec un homme.



Dans l'ensemble, les HSH ont utilisé moins le préservatif avec un partenaire féminin comparativement au partenaire masculin, excepté dans le Haut-Katanga où il a été utilisé à fréquence quasi égale. C'est à Kinshasa et dans le Kongo-Central que les HSH ont le plus utilisé le préservatif lors du dernier rapport avec un homme, environ la moitié des cas.

Dans l'ensemble, les HSH ont utilisé moins le préservatif avec un partenaire féminin comparativement au partenaire masculin, excepté dans le Haut-Katanga où il a été utilisé à fréquence quasi égale. C'est à Kinshasa et dans le Kongo-Central que les HSH ont le plus utilisé le préservatif lors du dernier rapport avec un homme, environ la moitié des cas.

## % d'HSH qui ont une connaissance approfondie du Sida\*



Dans toutes les provinces, moins de trois sur dix HSH, avaient une connaissance approfondie sur le VIH. Cette proportion était la plus faible à Kinshasa et dans le Kongo-Central, moins un cinquième.

Savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le virus du Sida, savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du Sida et rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission du virus du Sida par la piqûre de moustique et par la sorcellerie