





Dans toutes les provinces, parmi les miniers qui ont eu des symptômes d'IST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, plus de trois sur cinq ont recherché conseils au cours du dernier épisode d'IST. Cependant, au cours de cet épisode, moins de la moitié de miniers ont pris des médicaments, sauf au Haut Katanga (51,6%), Ituri (60,4%) et Lualaba (63,0%).

% de MINIERS qui ont recherché un conseil ou pris des médicaments lors du dernier épisode d'IST au cours des 12 mois précédant l'enquête




% de MINIERS qui n'ont jamais été testé pour le VIH

La proportion de miniers qui n'ont jamais été testé pour le VIH reste élevée. En dehors de la province du Sud Kivu (48,6%), plus de la moitié de miniers n'avaient jamais été testés précédemment pour le VIH.




Prévalence (%) du VIH chez les MINIERS

Moins d'un Minier sur vingt était positif au VIH, sauf au Kasai Oriental, où cinq pourcents l'ont été.



Moins de quatre miniers sur dix ont rapporté avoir entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours de six derniers mois précédant l'enquête, excepté dans les provinces du Kasai Oriental (54,6%) et de Lualaba (50,3%).

% de MINIERS qui ont entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Enquête de surveillance bio-comportementale auprès des populations clés à risque de l'infection par VIH dans 14 provinces, 2018-2019

PRINCIPAUX RESULTATS CHEZ LES MINIERS





% de MINIERS qui ont eu des rapports sexuels avec des PS lors des périodes d'absence de leur ménage au cours des 6 mois précédant l'enquête




Globalement, plus de la moitié de miniers ont eu des rapports sexuels avec des professionnels de sexe lors des périodes d'absence de leurs ménages au cours des 6 mois précédant l'enquête, excepté dans la province de la Tshopo (36,6%).

% de MINIERS qui ont eu des rapports sexuels avec des partenaires de sexe masculin au cours des 12 mois précédant l'enquête




En dehors des provinces du Haut-Uélé, du Lualaba et du Haut Katanga, une proportion considérable des miniers des autres provinces ont rapporté avoir eu des rapports sexuels avec des partenaires de sexe masculin au cours des 12 derniers mois.

% de MINIERS qui ont utilisé un condom lors des rapports sexuels avec un partenaire commercial ou occasionnel au cours des 12 mois précédant l'enquête



Globalement, moins de la moitié de miniers ont rapporté avoir utilisé le préservatif lors des rapports sexuels avec un partenaire occasionnel au cours des 12 mois précédant l'enquête, excepté dans la province du Sud Kivu (64%). Quant à l'usage du préservatif avec un partenaire commercial au cours de la même période, il a été rapporté par au moins la moitié de miniers, sauf dans la Tshopo (21%), l'Ituri (28%), le Haut-Uélé (29%) et Maniema (34%).

% de MINIERS qui ont une connaissance approfondie du Sida*



Globalement, moins d'un minier sur deux possédait une connaissance approfondie sur le VIH.

**Savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le virus du Sida, savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du Sida et rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission du virus du Sida par la piqûre de moustique et par la sorcellerie.*