





Parmi les UDI qui ont eu les symptômes des IST au cours de douze derniers mois dans les quatre provinces, plus de trois sur quatre ont recherché conseils au cours du dernier épisode d'IST. Cependant, au cours de cet épisode, moins de la moitié a pris des médicaments.

% d'UDI qui ont recherché un conseil ou pris des médicaments lors du dernier épisode d'IST au cours des 12 mois précédant l'enquête




% d'UDI qui n'ont jamais été testé pour le VIH

Dans les quatre provinces, plus de six UDI sur dix ne s'étaient jamais précédemment testé pour le VIH.




Prévalence (%) du VIH et de la Syphilis chez les UDI

Moins de deux pourcents d'UDI étaient testé positif au VIH, sauf à Kinshasa (4,8%). Au plus un pourcent d'UDI était testé positif à la Syphilis, excepté en Ituri (2,5%).



% d'UDI qui ont entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête

A Kinshasa et dans le Haut-Katanga, la moitié des UDI ont rapporté avoir entendu ou vu quelque chose sur le VIH/Sida au cours de six derniers mois précédant l'enquête. Cette proportion était de près de trois sur dix et de moins de cinq sur dix




respectivement dans le Kongo-Central et dans Ituri.

Dans toutes les provinces, moins d'un quart d'UDI possédait une connaissance approfondie sur le VIH.

**Savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le virus du Sida, savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du Sida et rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission du virus du Sida par la piqûre de moustique et par la sorcellerie.*

% d'UDI qui ont une connaissance approfondie du Sida*




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Enquête de surveillance bio-comportementale auprès des populations clés à risque de l'infection par VIH dans 14 provinces, 2018-2019

Principaux résultats chez les utilisateurs des drogues injectables (UDI)




% d'UDI selon le sexe




Moins d'un UDI sur dix était de sexe féminin, la proportion des UDI de sexe féminin était la plus élevée à Kinshasa (8,5%).

Age médian (ans) des UDI



Dans la globalité, la moitié de UDI avait eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 16 ans. L'activité sexuelle était plus précoce dans la province de l'Ituri où la moitié de UDI ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 14 ans. Quant à la consommation de la drogue, globalement la moitié d'UDI ont commencé à s'injecter de la drogue après l'âge de 18 ans. Cette consommation était plus tardive à Kinshasa et dans le Kongo-Central.


% d'UDI qui ont déjà utilisé une seringue usagée*



La seringue réutilisée expose à la contamination au VIH. Cependant, plus de la moitié des UDI ont rapporté avoir déjà utilisé une seringue usagée.


*une seringue qui a déjà été utilisée par une autre personne pour s'injecter de la drogue

% d'UDI de sexe masculin qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes au cours des 12 mois précédant l'enquête



Dans la province de l'Ituri, la quasi-totalité de UDI de sexe masculin ont rapporté avoir eu des rapports sexuels avec d'autres hommes au cours des 12 mois précédant l'enquête. Cette proportion était d'environ trois quart dans le Haut-Katanga et d'environ la moitié à Kinshasa et dans le Kongo-Central.

% d'UDI qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire commercial



Plus de la moitié des UDI ont rapporté avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire commercial ; sauf dans le Kongo-Central (46%).